

1. Нека је дата кружница  $k$  и тачка  $A$  ван ње. Наћи ГМТ тежишта троуглова  $\triangle ABC$  када се тачке  $B$  и  $C$  крећу по  $k$ .
2. Конструисати троугао ако је дата једна његова симетрална дуж, и дужи на које она дели одговарајућу страну тог троугла.
3. Дат је оштроугли троугао  $\triangle ABC$  и његова описана кружница  $k$ . Нека тангента на  $k$  у тачки  $A$  сече праву  $p(B,C)$  у  $P$ . Нека је  $M$  средиште дужи  $AP$ , и нека је тачка  $R$  други пресек праве  $p(M,B)$  и кружнице  $k$ . Ако је  $S$  други пресек праве  $p(P,R)$  и кружнице  $k$ , доказати да је  $CS \parallel AP$ .

Једна идеја: Најпре показати сличност троуглова  $\triangle MRP$  и  $\triangle MPB$  користећи потенцију из тачке  $M$ , и затим доказати тврђење задатка.

### Упутства за решења

1. Нека је  $l$  кружница са пречником  $OA$ , где је  $O$  центар кружнице  $k$ . Означимо са  $\kappa = \text{Int } k \setminus (l \cap O)$ , односно унутрашњост кружнице  $k$  којој су одузете све тачке које припадају кружници  $l$  сем тачке  $O$ . Тражено ГМТ је  $\kappa' = h_A^{\frac{3}{2}}(\kappa)$ .

Уочимо најпре да за тачку  $X \neq O$  унутрашности кружнице  $k$  важи  $\angle AXO = 90^\circ$  ако  $X \in l$ . Ово за  $X \neq O$  повлачи следеће: темена тетиве кружнице  $k$  су колинеарна са  $A$  ако  $X \in l$ . (Наравно, једина таква тетива кружнице  $k$  је она која је нормална на пречник који садржи тачку  $X$ .) Докажимо сада да је  $\kappa'$  тражено ГМТ.

Ако је  $\triangle ABC$  троугао такав да  $B, C \in k$ , онда је на основу горњих разматрања јасно да средиште  $A_1$  дужи  $BC$  припада  $\kappa$ , а пошто тежиште троугла дели тежишну дуж у односу  $2:1$ , онда тежиште троугла припада  $\kappa'$ . Овим је једна инклузија доказана.

Нека сада  $T \in \kappa'$ . Нека је  $A_1 = h_A^{\frac{3}{2}}(T)$ . Пошто  $A_1 \in \kappa$ , на основу разматрања из другог пасуса следи да постоји тетива  $BC$  кружнице  $k$  којој је  $A_1$  средиште, и тако да је  $T$  тежиште троугла  $\triangle ABC$ . Овим је доказана и друга инклузија.

2. Дати троугао се конструише тако што се најпре конструишу тачке  $A - C_1 - B$ , где су  $AC_1$  и  $C_1B$  дужи на које симетрална дуж  $CC_1$  дели страну  $AB$ . Затим се конструише Аполонијева кружница (уколико  $C_1$  није средиште  $AB$ , а у том случају се овакав троугао лако конструише) која садржи све тачке  $X$  такве да је  $|AX| : |XB| = |AC_1| : |C_1B|$ . Потом се тачка  $C$  добија као пресек Аполонијеве кружнице, и кружнице са центром у  $C_1$  и полупречником подударним симетралној дужи. Овакав троугао постоји ако је симетрална дуж краћа од пречника Аполонијеве кружнице. У том случају овај троугао је јединствено одређен.

3. На основу потенције из тачке  $M$  на кружницу  $k$  следи:

$$|MP|^2 = |MA|^2 = |MR| \cdot |MB|, \text{ што повлачи}$$

$$\frac{|MP|}{|MR|} = \frac{|MB|}{|MR|},$$

Пошто је  $\angle PMR = \angle BMP$  и  $\frac{|MP|}{|MR|} = \frac{|MB|}{|MR|}$ , следи  $\triangle PMR \sim \triangle BMP$ , па је  $\angle MPR = \angle MBP$ . Онда следи:

$$\angle APS = \angle MPR = \angle MBP = \angle RBC = \angle RSC = \angle PSC$$

пошто су  $\angle RBC$  и  $\angle RSC$  периферијски углови над истом тетивом. Одавде следи  $AP \parallel CS$ .

## Колоквијум 2

1.6.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић

Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

- Доказати да равнострани тетраедар има све подударне тежишне дужи.
- Дужи  $AB$  и  $CD$  се секу у тачки  $O$  под правим углом. Над дужима  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  и  $OD$ , као над пречницима, конструисане су кружнице. Доказати да су пресечне тачке (различите од  $O$ ) поменутих кружница концикличне.  
Једна идеја: Посматрати инверзију са погодном одабраним центром и произвољним полупречником.
- У кружном ПМХП конструисати Сакеријев четвороугао  $ABCD$  ( $\angle A \cong \angle B \cong d$ ) тако да његово теме  $A$  лежи у центру апсолуте.

### Упутства за решења

- На основу задатка са вежби знамо да се све четири тежишне дужи тетраедра секу у једној тачки - тежишту тог тетраедра. Нека је  $ABCD$  тетраедар, и нека су  $T_A$  и  $T_B$  тежишта страна  $\triangle BCD$  и  $\triangle ACD$ , редом, и нека је  $T$  тежиште тетраедра  $ABCD$  (и важи  $[AT_A] \cap [BT_B] = \{T\}$ ). Нека је  $E$  средшиште ивице  $CD$ . Очигледно важи  $A-T_B-E$  и  $B-T_A-E$ , па су  $A$ ,  $B$ ,  $T_A$ ,  $T_B$ ,  $E$ . Пошто је  $|AT_B| = \frac{2}{3}|AE| = \frac{2}{3}|BE| = |BT_A|$ , онда је  $ABT_A T_B$  једнакокраки трапез. Следи  $|AT_A| = |BT_B|$ . Аналогно се доказује и једнакост за преостале тежишне дужи тетраедра.
- Означимо са  $k_1, k_2, k_3$  и  $k_4$  кружнице над пречницима  $OA, OB, OC$  и  $OD$ , редом. Нека је  $k_1 \cap k_3 = \{O, P\}$ ,  $k_2 \cap k_3 = \{O, Q\}$ ,  $k_2 \cap k_4 = \{O, R\}$  и  $k_1 \cap k_4 = \{O, S\}$ . Доказујемо да су тачке  $P, Q, R$  и  $S$  концикличне. Користимо инверзију  $i_O$  произвољног полупречника, при чему ћемо са звездицама означавати слике објеката. Праве  $p(A, B)$  и  $p(C, D)$  остају фиксне јер пролазе кроз центар инверзије. Приметимо да је  $k_1^* \parallel p(C, D) \parallel k_2^*$  је кружнице  $k_1$  и  $k_3$  пролазе кроз центар инверзије  $O$  и додирују  $p(C, D)$  у  $O$ . Аналогно,  $k_3^* \parallel p(A, B) \parallel k_4^*$ . С обзиром да је  $p(A, B) \perp p(C, D)$  следи да је  $k_1^*, k_2^* \perp p(A, B)$  и  $k_3^*, k_4^* \perp p(C, D)$ . Другим речима, четвороугао  $P^* Q^* R^* S^*$  је правоугаоник. Дакле, тачке  $P^*, Q^*, R^*$  и  $S^*$  су концикличне, па како та кружница (на којој леже) не пролази кроз  $O$  следи да су и  $P, Q, R$  и  $S$  концикличне.

Додатни коментар: Задатак се могао решити и применом инверзије са центром у некој од поменутих тачака пресека. Такође, могуће је решити задатак без инверзије. Наиме, лако се доказује да тачке  $P, Q, R$  и  $S$  леже на страницама четвороугла  $ACBD$ , па се уочавањем неколико тетивних четвороуглова на слици и рутинским израчунавањем углова може добити тражени резултат.

- Конструисати два међусобно нормална пречника  $r_1$  и  $r_2$  апсолуте  $a$ . Нека је центар апсолуте  $A$ , и нека је тачка  $B$  произвољна тачка на  $r_1$  различита од  $A$ , и нека је  $D$  произвољна тачка на  $r_2$  различита од  $A$ . Конструисамо  $h$ -праву нормалну на  $r_1$  која садржи тачку  $B$  (она се добија конструисањем кружнице са пречником  $BB'$ , где је  $B' = i_a(B)$ ). Конструисамо  $h$ -симетралу  $h$ -дужи  $AB$   $s$  (јасно је да је  $s$  еуклидски кружни лук). Нека је  $C = i_s(D)$ . Конструисамо још  $h$ -дужи  $BC$

и  $CD$ . Пошто је  $BC$   $h$ -осносиметрична слика дужи  $AD$ , јасно је  $ABCD$  Сакеријев четвороугао.

Додатни коментар: Приметимо да смо могли и да избегнемо конструисање  $h$ -симетрале дужи  $AB$ . Уместо тога могли смо на  $r_1$  произвољно да одаберемо тачке  $S$  на  $r_1$  и  $D$  на  $r_2$  различите од  $A$ , и затим да конструисамо  $h$ -нормалу  $s$  на  $r_1$  кроз тачку  $S$ , а потом да конструисамо  $B$  и  $C$  као  $i_s(A)$  и  $i_s(D)$ , редом.

## Колоквијум 1

28.6.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић

Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

1. У трапезу  $ABCD$  са основицама  $AB$  и  $CD$  дијагонале се секу у  $E$ . Доказати да  $E$  лежи на радикалној оси Ојлерових кружница троуглова  $\triangle AED$  и  $\triangle BEC$ .

Једна идеја: Означити са  $C'$  пројекцију тачке  $C$  на  $BD$ , а са  $D'$  пројекцију тачке  $D$  на  $AC$ . Са  $C''$  означити средиште дужи  $BE$ , а са  $D''$  средиште  $AE$ . Користећи потенцију тачке  $E$  у односу на кружницу на којој леже  $C, D, C'$  и  $D'$  (објаснити зашто су ове тачке концикличне), те сличност  $\triangle AEB$  са још једним троуглом извести једнакост  $ED' \cdot ED'' = EC' \cdot EC''$  и одатле тврђење задатка.

2. Конструисати оштроугли троугао  $\triangle ABC$  ако су дати његови углови  $\angle A$  и  $\angle B$ , и обим троугла одређеног  $\triangle CED$ , где су  $D$  и  $E$  подножја нормала из темена  $A$  и  $B$ , редом.

Једна идеја: У анализи најпре одредити углове  $\angle CED$  и  $\angle CDE$ .

3. Нека је дата права  $p$  и тачка  $A$  ван ње. Одредити ГМТ ортоцентра троуглова  $\triangle ABC$ , где тачке  $B$  и  $C$  клизе по правој  $p$ .

### Упутства за решења

1. Због правих углова код  $C'$  и  $D'$  закључујемо да је четвороугао  $CDD'C'$  тетиван. На основу потенције тачке  $E$  у односу на описану кружницу четвороугла  $CDD'C'$  закључујемо да важи  $|EC| \cdot |ED'| = |ED| \cdot |EC'|$ . Ово имплицира

$$\frac{|EC|}{|ED|} = \frac{|EC'|}{|ED'|}.$$

Пошто троуглови  $\triangle ABE$  и  $\triangle CDE$  имају све подударне углове, важи  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ , па следи

$$\frac{|EC|}{|ED|} = \frac{|EA|}{|EB|} = \frac{|ED''|}{|EC''|} \text{ што повлачи}$$

$$\frac{|EC'|}{|ED'|} = \frac{|ED''|}{|EC''|}.$$

Дакле, важи  $|EC'| \cdot |EC''| = |ED'| \cdot |ED''|$ , па је потенција тачке  $E$  у односу на Ојлере кружнице троуглова  $\triangle AED$  и  $\triangle BCE$  једнака, и  $E$  припада радикалној оси ове две кружнице.

2. Лако се уочава да је четвороугао  $ABDE$  тетиван (због правих углова код  $D$  и  $E$ ), па је  $\angle BAC \cong 180^\circ - \angle BDE \cong \angle EDC$ . Аналогно се показује и да је  $\angle ABC \cong \angle DEC$ . Као у задатку са вежби можемо да конструисамо троугао  $\triangle EDC$ , а затим у пресеку

$p(A,C)$  и нормале на  $p(B,C)$  кроз  $D$  конструишемо теме  $A$ . Аналогно можемо да конструишемо и теме  $B$ .

Троугао  $\triangle EDC$  постоји и јединствен је (на основу горе поменутог задатка са вежби), и пошто је  $\angle C < 90^\circ$ , онда и троугао  $\triangle ABC$  постоји и јединствен је.

3. Нека је  $a$  права која садржи  $A$  и нормална је на  $p$ . Пошто је  $a \perp BC$ , онда је јасно да сваки ортоцентар троугла  $\triangle ABC$  лежи на правој  $a$ .

Докажимо и другу инклузију. Нека  $X \in a$ . Нека је  $a \cap p = \{O\}$ . Лако се уочава да за  $X \equiv O$  и  $X \equiv A$  одговарајуће тачке  $B$  и  $C$  постоје. Ако  $X \in (OA)$ , онда можемо произвољно да одаберемо тачку  $B$  на  $p$  различиту од  $O$ , а потом тачку  $C$  одредимо у пресеку нормале из  $A$  на  $p(B,X)$  и праве  $p$ . На сличан начин се могу одредити тачке  $B$  и  $C$  на  $p$  и у случају  $O-A-X$ . У случају  $X-O-A$  такође на сличан начин можемо одабрати тачке  $B$  и  $C$ , али при избору тачке  $B$  онда морамо да водимо рачуна да је  $\angle XBA \neq 90^\circ$  како бисмо осигурали да  $B$  и  $C$  буду различите тачке. (Дакле, одаберемо  $B$  на правој  $p$  различиту од  $O$ , и ван кружнице којој је пречник  $AX$ .)

## Колоквијум 2

28.6.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић

Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

1. Нека је  $ABCD$  тетраедар, и нека је  $\alpha$  раван нормална на  $r(B,C,D)$  која садржи теме  $A$  и центар описане кружнице стране  $\triangle BCD$ . Аналогно дефинишимо и равни  $\beta$ ,  $\gamma$  и  $\delta$ . Доказати да се ове четири равни секу у једној тачки.

Једна идеја: Доказати да је тражена тачка пресека нека значајна тачка тетраедра.

2. Нека се кружнице  $k$  и  $k'$  додирују изнутра у тачки  $A$ , и нека је  $k'$  мања кружница. Нека је  $B \in k'$  различита од  $A$ . Нека је  $C$  друга тачка пресека праве  $p(A,B)$  и кружнице  $k$ , и нека тангента на  $k'$  кроз  $B$  сече  $k$  у  $D$  и  $E$ . Доказати да је  $p(C,E)$  тангента на описану кружницу троугла  $\triangle ABE$ .

Једна идеја: Посматрати инверзију  $i_C^{\sqrt{|CA| \cdot |CB|}}$ . Известити закључке о сликама кружница  $k'$  и  $k$ , и тачке  $E$ . Затим доказати тврђење задатка.

3. Конструисати исечак величине четвртине круга у кружном ПМХП, ако је центар круга задат, и различит од центра апсолуте.

## Упутства за решења

1. Пресечна тачка је  $O$ , центар описане сфере тетраедра. Пошто је  $O$  једнако удаљена од  $A$ ,  $B$  и  $C$ , онда она лежи на нормали на  $r(A,B,C)$  кроз  $O$ , па пошто ова нормала лежи у  $\delta$ , онда је и  $O \in \delta$ . Аналогно се показује да  $O$  припада и осталим наведеним равнима, чиме је тврђење задатка доказано. (Ово следи и из задатка са вежби.)
2. Нека је  $l = k(C, \sqrt{|CA| \cdot |CB|})$ . Онда је  $i_l(A) = B$  (и  $i_l(B) = A$ ). Из овога се лако може закључити да је  $i_l(k') = k'$ . (Нека је  $i_l(k') = k'_1$ , и нека су  $O$  и  $O_1$  центри од  $k'$  и  $k'_1$ , редом. Пошто важи  $O, O_1 \in p(C, O) \cap s_{AB}$ , онда је  $O \equiv O_1$ . Пошто  $k'$  и  $k'_1$  имају заједничке центре и бар једну заједничку тачку, онда је  $k' \equiv k'_1$ .) Даље,  $k$  се слика

на праву којој је  $B$  једина заједничка тачка са  $k'$ , па је  $i_l(k) = p(D, E)$ . Дакле, важи и  $i_l(E) = E$ , и  $E \in l$ .

Нека је  $k_0$  описана кружница троугла  $\triangle ABE$ . Важи  $E \in k_0$ , и пошто је  $|CE|^2$  једнако потенцији  $C$  у односу на  $k_0$ , онда је  $p(C, E)$  тангента кружнице  $k_0$ , што је требало доказати.

3. Нека су  $a$  и  $O$  апсолута и њен центар, редом. Нека је  $A$   $h$ -тачка различита од  $O$ . Конструиримо  $A' = i_a(A)$ . Одаберимо  $B \in (OA)$ , и нека је  $B' = i_k(B)$ , где је  $k$  кружница којој је  $AA'$  пречник. Конструиримо затим кружницу  $k_1$  са пречником  $BB_1$ , и нека  $C$  једна пресечна тачка  $k$  и  $k_1$ . Онда за тражени кружни исечак можемо да одаберемо фигуру ограничену с дужи  $AB$ , и мањим луковима  $\widehat{BC}$  и  $\widehat{AC}$ .

### Колоквијум 1

6.9.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић  
Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

1. Дат је прав угао  $\angle aOb$ , и нека дуж  $AB$  задате дужине клизи у његовој унутрашњости тако да  $A$  клизи по  $a$ , а  $B$  по краку  $b$ . Одредити ГМТ средишта дужи  $AB$ .
2. Пресек дијагонала конвексног четвороугла  $ABCD$  је тачка  $M$ . Нека симетрала угла  $\angle ACD$  сече праву  $p(A, B)$  у  $K$ . Ако важи

$$|MA| \cdot |MC| + |MA| \cdot |CD| = |MB| \cdot |MD|,$$

доказати да важи  $\angle BKC \cong \angle CDB$ .

Једна идеја: Означити са  $k$  кружницу са центром у  $C$  и полупречником подударним са  $CD$ . Нека је  $E$  пресечна тачка  $p(A, C)$  и  $k$  таква да је  $A-C-E$ . Применом потенције доказати да је  $ABED$  тетиван. Одредити однос углова  $\angle ACD$  и  $\angle ABD$ . Известити закључак о још једном четвороуглу, и доказати тражену подударност.

3. Конструисати правоугли троугао, ако је задата његова тежишна дуж која одговара правом углу, и ако је дужина те тежишне дужи геометријска средина дужина катета.

### Упутства за решења

1. Нека је  $|AB| = d$ . Означимо са  $\mathcal{S}$  део кружнице  $k(O, \frac{d}{2})$  који се налази у унутрашњости датог правог угла. Показаћемо да је  $\mathcal{S}$  тражено ГМТ.

Нека је  $X$  средиште дужи  $AB$  такве да  $A \in a$  и  $B \in b$ . Онда је  $OX$  тежишна дуж која одговара хипотенузи у правоуглом троуглу  $AOB$ , па је  $|OX| = \frac{d}{2}$ . Дакле,  $X \in \mathcal{S}$ .

Нека  $X \in \mathcal{S}$ . Докажимо да је  $X$  средиште неке дужи дужине  $d$  са крајевима на краковима датог правог угла. Означимо са  $\alpha$  угао који  $OX$  заклапа са  $a$ . Полуправа (у полуравни која садржи  $a$ ) са почетком у  $X$  која са  $OX$  заклапа угао  $180^\circ - 2\alpha$  сече  $a$  у  $A'$  под углом  $\alpha$ , па је  $|XA'| = \frac{d}{2}$ . Слично, продужетак преко  $X$  сече полуправу  $b$  у  $B'$  под углом  $90^\circ - \alpha$ , па је  $|XB'| = \frac{d}{2}$ . Коначно,  $|A'B'| = d$ .

2. Једнакост из услова задатка је еквивалентна са  $|MA| \cdot (|MC| + |CD|) = |MB| \cdot |MD|$ , односно  $|MA| \cdot (|MC| + |CE|) = |MB| \cdot |MD|$ . Дакле,  $|MA| \cdot |ME| = |MB| \cdot |MD|$ , па су на основу задатка са вежби тачке  $A, B, E$  и  $D$  концикличне. Из особина периферијских и централних углова над истом тетивом добијамо да је  $\angle ACD = 2\angle ABD$ , што нам са условом  $\angle ACD = 2\angle KCD$  даје  $\angle ABD = \angle KCD$ , тј.  $\angle KBD = \angle KCD$ . Доказали смо да су тачке  $K, B, C$  и  $D$  концикличне, па је  $\angle BKC = \angle CDB$ .
3. Означимо са  $a, b$  и  $c$  дужине две катете и хипотенузе. Услови задатка су сада обједињени у једнакост  $\sqrt{ab} = \frac{c}{2}$ . Како је  $ab = \frac{c^2}{4}$ , користећи формулу за површину троугла, добијамо да је  $h_c = \frac{c}{4}$ , где је  $h_c$  висина на хипотенузу. Сада лако конструишемо тражени троугао. Наиме, прво конструишемо полукружницу са пречником  $|AB| = c$ , па на растојању  $\frac{c}{4}$  конструишемо праву паралелну са  $p(A, B)$ . У пресеку конструисане праве и полукружнице добијамо тачку  $S$ .

## Колоквијум 2

6.9.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић

Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

- Нека је  $ABCD$  тетраедар, и нека су равни  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  нормалне на ивице  $BC$ ,  $AC$  и  $AB$ , редом, и нека све три садрже  $D$ . Доказати да је пресек  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  права.
- Нека су  $\triangle ABC$  троугао,  $O$  центар његове описане кружнице  $k$ ,  $I_A$  центар његове споља приписане кружнице  $k_A$  наспрам темена  $A$ , и  $D$ ,  $E$  и  $F$  додирне тачке споља приписане кружнице са правама  $p(A, C)$ ,  $p(B, C)$  и  $p(A, B)$ , редом. Нека је  $O_1$  центар Ојлерове кружнице  $k_O$  троугла  $\triangle DEF$ . Доказати да су  $O$ ,  $O_1$  и  $I_A$  колинеарне.  
Једна идеја: Доказати да је  $i_{k_A}(k_O) = k$ .
- За задату  $h$ -тачку  $A$  и  $h$ -дуж  $BC$  у кружном Поенкареовом моделу хиперболичне планиметрије конструисати  $h$ -кружницу којој је  $h$ -центар  $A$  и  $h$ -полупречник подударан са  $BC$ .

### Упутства за решења

- Означимо са  $h_D$  праву која садржи висину тетраедра из темена  $D$ . Како је  $p(A, B) \perp \alpha$  следи да је  $r(A, B, C) \perp \alpha$ . Узимајући у обзир да је  $D \in \alpha$  и  $D \in h_D$  закључујемо да  $h_D \subset \alpha$ . Аналогно,  $h_D \subset \beta$  и  $h_D \subset \gamma$ , па је  $\alpha \cap \beta \cap \gamma = h_D$ .
- Нека су  $X, Y$  и  $Z$  средишта дужи  $DF, FE$  и  $ED$ , редом. Докажимо да се инверзијом  $i_{k_A}$  тачке  $X, Y$  и  $Z$  сликају у  $A, B$  и  $C$ , редом. Како је  $\angle XI_A F \cong FI_A A$  и  $\angle I_A X F \cong \angle I_A F A \cong d$  имамо да је  $\triangle XI_A F \sim \triangle FI_A A$ . Из сличности добијамо  $\frac{I_A X}{I_A F} = \frac{I_A F}{I_A A}$ , односно  $I_A X \cdot I_A A = I_A F^2$ , чиме смо доказали да је  $i_{k_A}(X) = A$ . Аналогно за  $Y$  и  $Z$ , па је  $i_{k_A}(k_O) = k$ . Како се кружница  $k_O$  слика у  $k$  следи да су њихови центри и центар инверзије колинеарни, што је и требало доказати.
- Без умањења општости претпоставимо да је  $A \equiv B$ . Ако то није случај можемо  $h$ -осномсиметрично пресликати  $B$  у  $A$ . Нека су  $s_1$  и  $s_2$  две произвољне  $h$ -праве кроз  $A$  различите од  $h$ -праве  $AC$ . Означимо  $C' = i_{s_1}(C)$  и  $C'' = i_{s_2}(C)$ . Како је у питању  $h$ -осна симетрија  $h$ -дужи  $AC'$  и  $AC''$  леже на кружници са центром у  $A$  и полупречником  $AC$ , па је тражена кружница она која садржи  $C, C'$  и  $C''$ .

**Колоквијум 1**

28.9.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић  
Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

1. Нека је дат једнакостраничан троугао  $ABC$ , и нека су дате тачке  $M$  и  $N$  у спољашњости тог троугла. Ако се тачка  $P$  креће у унутрашњости троугла  $\triangle ABC$ , одредити ГМТ тежишта троуглова  $\triangle MNP$ .
2. Конструисати оштроугли троугао  $\triangle ABC$  ако су дати његови углови код темена  $A$  и  $B$ , и обим његовог ортичког троугла. (Ортички троугао троугла  $\triangle ABC$  је троугао кога чине подножја висина троугла  $\triangle ABC$ .)  
Једна идеја: Нека су  $A_1$ ,  $B_1$  и  $C_1$  подножја висина из темена  $A$ ,  $B$  и  $C$ , редом. Одредити углове троуглова  $\triangle AC_1B_1$ ,  $\triangle BA_1C_1$  и  $\triangle CB_1A_1$ , а затим одредити углове ортичког троугла.
3. Нека је  $\triangle ABC$  оштроугли троугао, нека су  $A'$ ,  $B'$  и  $C'$  подножја висина из темена  $A$ ,  $B$  и  $C$ , редом, и нека су  $k_c$  и  $k_b$  кружнице са пречницима  $AB$  и  $AC$ , редом. Нека  $k_c$  сече у  $M$  и  $N$  висину  $CC'$  и њен продужетак, редом, и нека  $k_b$  сече у  $P$  и  $Q$  висину  $BB'$  и њен продужетак, редом. Доказати да су  $M$ ,  $N$ ,  $P$  и  $Q$  концикличне.  
Једна идеја: Применити потенцију из ортоцентра троугла.

**Упутства за решења**

1. Нека је  $Q$  средиште дужи  $MN$ . Нека је

$$A' = h_Q^{\frac{1}{3}}(A), B' = h_Q^{\frac{1}{3}}(B) \text{ и } C' = h_Q^{\frac{1}{3}}(C).$$

Тражено ГМТ је  $\text{Int}(\triangle A'B'C') \setminus p(M, N)$ .

2. Пошто су углови  $\angle AA_1B$  и  $\angle AB_1B$  прави, онда је четвороугао  $ABA_1B_1$  тетиван, па је  $\angle B_1A_1C = \angle 180^\circ - \angle B_1A_1B = \angle BAC$ . Аналогно се одређују и остали углови троуглова  $\triangle AC_1B_1$ ,  $\triangle BA_1C_1$  и  $\triangle CB_1A_1$ , а потом се лако одређују и углови ортичког троугла.. Ортички троугао могуће је конструисати као у задатку са вежби, а пошто су нам познати сви потребни углови лако конструираемо и троугао  $\triangle ABC$ .
3. Пошто је  $\angle AA'B = \angle AB'B = 90^\circ$ , онда  $A', B' \in k_c$ , и аналогно закључујемо и  $A', C' \in k_b$ . Дакле,  $AA'$  је заједничка тетива кружница  $k_c$  и  $k_b$ , па применом потенције из тачке  $H$  на  $k_c$  и  $k_b$  добијамо

$$|HM| \cdot |HN| = |HA| \cdot |HA'| = |HP| \cdot |HQ|,$$

што имплицира да су  $M$ ,  $N$ ,  $P$  и  $Q$  концикличне.

**Колоквијум 2**

28.9.2017.

Основи геометрије 2

Професор: Војислав Петровић  
Асистенти: Владо Уљаревић и Самир Захировић

1. Нека је дат тетраедар  $ABCD$ , и нека тачка  $E$  лежи на ивици  $AD$ , и  $E \neq A, D$ . Доказати да је збир углова код темена  $E$  тетраедра  $ABCE$  већи од збира углова код темена  $D$  тетраедра  $ABCD$ .  
Једна идеја: Изразити тражену неједнакост помоћу бочних углова триедара  $\triangle CBE$  и  $\triangle BDE$ .

2. Нека је  $k$  са центром у  $O$  описана кружница троугла  $\triangle ABC$ . Нека је  $k_X$  кружница која садржи  $A$  и  $O$  таква да њен центар  $X$  лежи на симетрали странице  $BC$ . Аналогно дефинишимо и кружнице  $k_Y$  и  $k_Z$  са центрима у  $Y$  и  $Z$ , редом. Доказати да кружница која додирује  $k_X$ ,  $k_Y$  и  $k_Z$  додирује и кружницу  $k$ .

Једна идеја: Посматрати инверзију  $i_k$ , и доказати тврђење користећи Фојербахову теорему.

3. Нека је у кружном ПМХП дат  $h$ -угао  $\angle aOb$ , при чему  $O$  није центар апсолуте. Конструисати  $h$ -симетралу  $h$ -угла  $\angle aOb$ .

Једна идеја: Искористити чињеницу да је симетрала основице једнакокраког троугла истовремено и симетрала напратног угла тог троугла.

### Упутства за решења

1. Користећи чињенице да је спољашни угао троугла једнак збиру два несуседна унутрашња, и да је збир углова у троуглу  $180^\circ$  следи:

$$\begin{aligned} \angle AEB + \angle BEC + \angle AEC &> \angle ADB + \angle BDC + \angle ADC \text{ ако} \\ (\angle ADB + \angle DBE) + (180^\circ - \angle CBE - \angle BCE) + (\angle ADC + \angle DCE) &> \\ \angle ADB + (180^\circ - \angle CBD - \angle BCD) + \angle ADC &\text{ ако} \\ (\angle DBE + \angle CBD) + (\angle DCE + \angle BCD) &> \angle CBE + \angle BCE, \end{aligned}$$

а последња неједнакост одавде важи јер је пљосан триедра мања од збира друге две. Овим је тврђење задатка доказано.

2. Означимо кружницу која додирује  $k_X$ ,  $k_Y$  и  $k_Z$  са  $k_O$ . Пошто  $k_X$ ,  $k_Y$  и  $k_Z$  садрже центар инверзије  $i_k$ , онда се оне том инверзијом сликају на праве  $x$ ,  $y$  и  $z$ , редом. Кружница  $k$  слика се на саму себе, а кружница  $k_O$  се слика на кружницу  $k_I$  која додирује праве  $x$ ,  $y$  и  $z$ .

Нека су  $s_{BC}$  симетрала странице  $BC$ , и нека је  $A^* = \sigma_{s_{BC}}$ . Пошто  $s_{BC}$  садржи центре обе кружнице  $k$  и  $k_X$ , и пошто  $A \in k \cap k_X$ , онда и  $A^* \in k \cap k_X$ . Пошто је  $p(A, A^*) \perp s_{B,C} \perp p(B, C)$ , онда је  $p(B, C) \parallel p(A, A^*) \equiv x$ . Аналогно се доказује да важи и  $p(A, B) \parallel z$  и  $p(A, C) \parallel y$ . Означимо са  $P$ ,  $Q$  и  $R$  пресечне тачке у и  $z$ , и  $x$  у  $z$ , и  $x$  и  $y$ , редом. Лако се уочава да су  $A$ ,  $B$  и  $C$  средишта страница троугла  $\triangle PQR$ , па је  $k$  његова Ојлерова кружница. Пошто  $k_I$  додирује  $x$ ,  $y$  и  $z$ , следи да је  $k_I$  центар уписане кружнице троугла  $\triangle PQR$  (лако се уочава да  $k_I$  није споља приписана кружница овог троугла).

3. Конструисати произвољну  $h$ -кружницу са центром у  $O$ . У пресеку ове кружнице са  $a$  и  $b$  добијају се тачке  $A$  и  $B$ .  $h$ -симетрала угла  $\angle aOb$  је одговарајућа  $h$ -полуправа која лежи на  $h$ -симетрали  $h$ -дужи  $AB$ . На основу Фојербахове теореме  $k$  и  $k_I$  се додирују, па следи да се и  $k$  и  $k_O$  додирују.